

Diarrhoesan®

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Diarrhoesan®

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren

Wirkstoffe: Pektin und Kamillenblüten-Fluidextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Diarrhoesan® jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 2 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Diarrhoesan® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Diarrhoesan® beachten?
3. Wie ist Diarrhoesan® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Diarrhoesan® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Diarrhoesan® und wofür wird es angewendet?

Diarrhoesan® ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Diarrhoesan® wird traditionell zur unterstützenden Behandlung von leichten akuten (unspezifischen) Durchfallerkrankungen angewendet.

Diarrhoesan® ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Diarrhoesan® beachten?

Diarrhoesan® darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile von Diarrhoesan® sind.
- von Neugeborenen und Säuglingen

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Diarrhoesan® ist erforderlich:

Bei Durchfällen kommt es zu einem vermehrten Flüssigkeits- und Salzverlust. Achten Sie daher auf den Ersatz von Flüssigkeit und Salzen (Elektrolyten) als wichtigste therapeutische Maßnahme. Dies gilt besonders für Kinder und ältere Menschen.

Bei fortdauernden Krankheitssymptomen über zwei Tage hinaus oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige Person aufgesucht werden.

Kommt es im Rahmen der Durchfallerkrankung zu Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhungen ist ebenfalls ein Arzt aufzusuchen.

Bei Einnahme von Diarrhoesan® mit anderen Arzneimitteln:

Es liegen keine systematischen Untersuchungen mit Diarrhoesan® zu Wechselwirkungen vor. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auf Grund der angenommenen Wirkungsweise von Diarrhoesan® die Aufnahme von gleichzeitig eingenommenen Arzneimitteln im Magen oder Darm verringert wird. Dies kann auch schon durch die Durchfallerkrankung selbst verursacht werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von Diarrhoesan® nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Diarrhoesan®:

Enthält Aspartam als Quelle für Phenylalanin und kann schädlich sein für Patienten mit Phenylketonurie.

Diarrhoesan® enthält 1,5 Vol. % Alkohol.

3. Wie ist Diarrhoesan® einzunehmen?

10 ml Diarrhoesan® entsprechen: 0,33 ml Pektin und 0,25 ml Fluidextrakt aus Kamillenblüten. Nehmen Sie Diarrhoesan® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Dosierung soweit nicht anders verordnet:	Anfangsdosierung	Anschließend stündlich	Tageshöchst-dosis
Erwachsene/Kinder ab 6 Jahren	30 ml	15 ml	120 ml
Kinder von 4-5 Jahren	20 ml	10 ml	80 ml
Kinder von 2-3 Jahren	10 ml	5 ml	60 ml

Um die genaue Abmessung der in der Tabelle angegebenen Dosen zu erleichtern, enthält jede Packung einen skalierten Messbecher.

Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren:

Die Anwendung bei Neugeborenen und Säuglingen ist nicht vorgesehen (s. Abschnitt Diarrhoesan® darf nicht eingenommen werden). Die Anwendung bei Kindern im Alter von einem Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen und in diesem Alter zur Behandlung einer derartigen Erkrankung ein Arzt aufgesucht werden sollte.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Diarrhoesan® wird bei Kleinkindern zweckmäßig in Getränken oder Suppen verabreicht. Vor Gebrauch schütteln.

Dauer der Anwendung:

Diarrhoesan® sollte erst dann abgesetzt werden, wenn ein geformter Stuhl zu beobachten ist. Bei fortdauernden Krankheitssymptomen über zwei Tage sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige Person aufgesucht werden. Beachten Sie auch die Angaben unter „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Diarrhoesan® ist erforderlich“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Diarrhoesan® zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Diarrhoesan® eingenommen haben, als Sie sollten:

Von den pflanzlichen Bestandteilen in Diarrhoesan® sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten. Bei Auftreten von Beschwerden sollten Sie jedoch Ihren Arzt informieren.

Wenn Sie die Einnahme von Diarrhoesan® vergessen haben:

Wenn eine Anwendung vergessen wurde, lassen Sie diese ersatzlos entfallen und verabreichen beim nächsten Mal wieder die vorgeschriebene Menge.

Wenn Sie die Einnahme von Diarrhoesan® abbrechen:

Bislang sind keine Berichte über unerwünschte Wirkungen einer Unterbrechung oder eines vorzeitigen Abbruchs der Therapie mit Diarrhoesan® bekannt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Diarrhøesan® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Überempfindlichkeitsreaktionen (insbesondere im Mundbereich und an der Haut) wurden beobachtet. Die Häufigkeiten sind auf Grund der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie einen Arzt, damit er über den Schweregrad und über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Diarrhøesan® nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Diarrhøesan® aufzubewahren?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Präparat soll gut verschlossen nicht über 30° C aufbewahrt werden, also bitte nicht in die Sonne oder in die Nähe der Heizung stellen. Bei längerer Lagerung können leichte Absetzungen eintreten, die aber die Wirksamkeit des Präparates in keiner Weise beeinträchtigen.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 30°C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Diarrhøesan® ist nach Anbruch 12 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

Was Diarrhøesan® enthält:

100 ml Flüssigkeit enthalten die Wirkstoffe: 3,2 g Pektin, 2,5 g Fluidextrakt aus Kamillenblüten (1:0, 9-1,1), Auszugsmittel Ethanol 55% (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Natriumbenzoat, Saccharin-Natrium, Bananen-Aroma, gereinigtes Wasser, Aspartam

Wie Diarrhøesan® aussieht und Inhalt der Packungen:

Diarrhøesan® ist eine hellbraune bis braune, dickflüssige trübe Flüssigkeit. Diese ist erhältlich in einer Originalpackung mit 200 ml (N1) Flüssigkeit.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
Telefon: 0 41 71 / 707-0
Telefax: 0 41 71 / 707-125
E-Mail: info@loges.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2011.

Behandlung von Durchfallerkrankungen: Viel Flüssigkeit, Diät und natürliche Arzneimittel

Durchfälle sind für Erwachsene häufig nur lästige Erkrankungen, die das Allgemeinbefinden einschränken. Für Kinder, besonders in den ersten Lebensjahren, ist Durchfall durchaus belastend und häufig schmerzhaft. Durch Flüssigkeitsverluste kann es zu ernstzunehmenden gesundheitlichen Problemen kommen. Mit Kindern unter zwei Jahren muss deswegen unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Grundlage jeder Behandlung ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, eine ausgewogene Diät und eine möglichst milde Arzneimitteltherapie zur Beschleunigung der Heilung. Bewährt hat sich Diarrhøesan®. Es sorgt mit seinen natürlichen Wirkstoffen auf mehrfache Weise für die rasche Wiederherstellung des natürlichen Verdauungsmilieus:

- Apfelpektin bindet im Darm vorhandene Gifte, kleidet die gereizte Darmwand mit einem Schutzfilm aus und trägt zur raschen Wiederherstellung der natürlichen Darmbewegungen bei.
- Kamillenextrakt lindert durch seine krampflösenden und entzündungshemmenden Eigenschaften die quälenden Begleiterscheinungen des Durchfalls.

Diarrhøesan® hat sich seit mehr als 25 Jahren bewährt. Seine gute Verträglichkeit und die flüssige Darreichungsform machen Diarrhøesan® außerdem zu einem besonders kindgerechten Präparat.

Wir wünschen Ihnen für Ihre Gesundheit alles Gute.

Ihre Dr. Loges + Co. GmbH